

# Ueber einige neue Methoden zur Erkennung und quantitativen Bestimmung von stickstoffhaltigen Körpern.

---

Inaugural-Dissertation

zur

**Erlangung der Doktorwürde**

der

hohen philosophischen Fakultät (II. Sektion)

der

**Kgl. Bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München**

vorgelegt am 7. Oktober 1904.

von

**Kurt Lequis**

aus Köln am Rhein.

---

**München, 1905.**

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



# Ueber einige neue Methoden zur Erkennung und quantitativen Bestimmung von stickstoffhaltigen Körpern.

Inaugural-Dissertation

zur

**Erlangung der Doktorwürde**

der

hohen philosophischen Fakultät (II. Sektion)

der

**Kgl. Bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München**

vorgelegt am 7. Oktober 1904

von



**Kurt Lequis**

aus Köln am Rhein.

---

**München, 1905.**

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



Es ist mir eine angenehme Pflicht, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn

Obermedizinalrat, Hofrat Prof. Dr. A. Hilger, sowie Herrn Dr. Pfyl, unter dessen liebenswürdiger Anleitung diese Arbeit entstand, auch an dieser Stelle meinen Dank auszusprechen.



Digitized by the Internet Archive  
in 2026.

## Theoretischer Teil.

---

Die Methoden zur Erkennung und Trennung stickstoffhaltiger Körpergruppen, Klassen etc. sind für die angewandte Chemie, wie Nahrungs-, physiologische und pharmazeutische Chemie von grösster Bedeutung. Leider ist der Ausbau der organischen Chemie in dieser Hinsicht noch vollständig in der Entwicklung begriffen. Wir finden nur sehr spärliche Methoden in der Litteratur über Reaktionen, die z. B. für ganze stickstoffhaltige Körpergruppen Anwendung finden. Über quantitative Bestimmung von ganzen Körpergruppen sind ebenfalls nur wenige Publikationen erschienen. Die Abtrennung beruht meist auf der Methode der Fällung, die in den seltensten Fällen brauchbare Zahlen liefert.

Ich stellte mir nun die Aufgabe, die Einwirkung von salpetriger und schwefliger Säure auf organische stickstoffhaltige Körper zu studieren und zu prüfen, ob sich nicht daraufhin einige neue Methoden zur Trennung und quantitativen Bestimmung von stickstoffhaltigen Körpern gründen liesse.

Die Arbeit hat sehr schöne Resultate gezeitigt, indem es mir gelungen ist, tatsächlich neue Methoden zu schaffen.

### I. Qualitative Untersuchungen.

#### Salpetrige Säure.

$\text{INO}_2$  Ich habe dieselbe in folgender Weise zur Einwirkung gebracht:

1. als Natriumnitrit und zwar:

- a) ohne irgendwelchen anderen Zusatz,
- b) als freie salpetrige Säure, indem zu einem Überschuss von Natriumnitrit  $\frac{1}{10}$  N.-Salzsäure zuge-tröpfelt wurde,
- c) bei aromatischen Basen speziell als freie salpetrige Säure mit einem Überschuss von Mineralsäuren.

Zu einem Überschuss des stickstoffhaltigen Körpers liess ich einige Tropfen  $\frac{1}{10}$  Natriumnitrit einwirken und beobachtete, ob freie salpetrige Säure auftrat oder nicht. Es war in erster Linie notwendig, für alle Fälle die richtigen Indikatoren zu finden. Für freie salpetrige Säure bei Ausschluss von anderen Säuren eigneten sich viele Indikatoren für salpetrige Säure, wie z. B. Antipyrin, das in mineralsaurer Lösung als der beste gefunden wurde, nicht, während andererseits der beste Indikator für  $\text{HNO}_2$  allein,  $\beta$ -Naphthylamin bei Gegenwart von Mineralsäuren nicht zu gebrauchen ist.

Theoretisch liess sich nun voraussehen, dass ausgesprochene Basen salpetrige Säure einfach addieren; es war also in einer Lösung von überschüssiger Basis und Natriumnitrit nach Zusatz von  $\frac{1}{10}$  N.-Salzsäure keine Reaktion auf freie salpetrige Säure zu konstatieren.

Basen von Säurecharakter sollten direkt aus Natrium-nitrit salpetrige Säure in Freiheit setzen.

Neutrale Körper werden überhaupt nicht reagieren; es tritt also sofort die salpetrige Säure-Reaktion auf. Diese Voraussetzungen haben sich bestätigt.

$\text{SO}_2$  Es lag nun nahe, auch die Additionsfähigkeit von schwef-liger Säure, die als freie Säure sehr leicht in geringster Menge nachgewiesen werden kann, zu prüfen. Basen, die salpetrige Säure nicht anlagern, könnten event. immer noch so stark sein, dass sie die stärkere schweflige Säure addieren. Es mussten so Abstufungen von Körpergruppen entstehen. Auch

diese Voraussetzungen haben sich erfüllt. Wie nun durch die Reaktion mit salpetriger und schwefliger Säure zusammen eine Abtrennung und Unterscheidung von Basen möglich ist, zeigt am besten folgender systematische Auszug aus dem experimentellen Material.

Abteil. I. Körper, die sichtbar mit Natriumnitrit eine Veränderung eingehen (Auftreten von Färbungen):

1. Barbitursäure und
2. Naphtionsäuren und Amidobenzoensäuren.

Abteil. II. Körper, die mit überschüssigem Nitrit bei Zusatz von  $\frac{1}{10}$  N.-Salzsäure sich sichtbar verändern (Auftreten von Färbungen und Ausscheidungen):

1. Alle aromatischen Amine mit Ausschluss der sekundären Amine;
2. die Hydrazine:
  - a) Hydrazine mit Benzolkern geben nur weisse bis gelbe milchige Trübung,
  - b) Hydrazine mit Naphtalinkern starke Färbungen;
3. Pyrrol.

Abteil. III. Körper, die sich mit Natriumnitrit mit oder ohne Salzsäure nicht sichtbar verändern und durch ihr Verhalten gegen  $\text{SO}_2$  und  $\text{HNO}_2$  charakterisiert werden.

#### 1. Klasse.

Körper, die aus saurem, schwefligsaurem Natron schweflige Säure in Freiheit setzen.

Von den Diazolen: Parabansäure.

Von Diazinen: Dialursäure und Alloxan.

Acylierte Amidosäuren: z. B. Hippursäure, Benzoylalanin, Oxalursäure, Hydantoinsäure.

Amidodicarbonsäuren: z. B. Asparaginsäure, Glutaminsäure.

Amidobenzoensäuren.

## 2. Klasse.

Körper, die schweflige Säure nicht, hingegen salpetrige Säure in Freiheit setzen.

Von den Diazolen: Hydantoin, Allantoin.

Von den Diazinen: Veronal.

Von den Purinbasen: Harnsäure.

## 3. Klasse.

Körper, die  $\text{SO}_2$  und  $\text{HNO}_2$  nicht frei machen, aber auch nicht anlagern:

Nitrile, Senföle, Rhodanide, Oxime, Nitrosamine, Säureamide, Säureimide, Amidosäureamide der Dicarbonsäuren, Indole, Pyrazolone, Pyrrolidincarbonsäuren, acylierte Pyridine (acyliert am Stickstoff), z. B. Analgen, acylierte Piperidine (acyliert am Stickstoff), z. B. Piperin, Oxylepidin, Alloxantin, Aniline mit Estergruppen und Halogen, Purinbasen, Kreatin und Kreatinin, Hydrazine.

## 4. Klasse.

Körper, die  $\text{SO}_2$  anlagern, aber nicht  $\text{HNO}_2$ :

Pyridine und Pyridine mit nicht sauren Gruppen, Chinolin und Chinoline mit nicht sauren Gruppen, Tetrahydropyridine mit  $\text{COOR}$ , Hexahydrochinoline mit  $\text{COOH}$  oder Laktongruppen, Glycosamin.


## 5. Klasse.

Körper, die sowohl  $\text{HNO}_2$  wie  $\text{SO}_2$  anlagern (resp. unsichtbar aufnehmen wie die arom. sek. Amine):

Aliphatische Amine, Aminoalkohole, Aminoaldehyde, Ammoniumbasen, sekundäre aromat. Amine, Hydrierte: Pyridine, Chinoline, Azole, Diazine, Guanidine, die keine negativen Gruppen enthalten, Hexamethylentetramin.


Diese Zusammenstellung bietet theoretisch Interessantes in Fülle, ich will jedoch nur einiges aus der dritten Abteilung herausgreifen. Die Körper der letzten Klasse dieser Abteilung

können alle durch Wegnahme von Wasserstoff oder durch Einführung von Sauerstoff und negativen Substituenten successive oder sprungweise bis zu Körpern der ersten Klasse übergehen; dabei spielen die folgenden Substituenten die Hauptrolle:




Beispiele:


1.




2.




3.



4.



5.



V. Kl.            III. Kl.

Purin → Hypoxanthin → Harnsäure.

Der Wert dieser Systematisierung zur Auffindung und Identifizierung von schon bekannten stickstoffhaltigen Körpern dürfte ohne weiteres klar sein, aber wir sind auch dadurch imstande, einen neu aufgefundenen oder dargestellten näher und sicher zu charakterisieren. Alle Indikatoren für Basen und Säuren werden nie annähernd ein mit der Theorie so im Einklang stehendes Bild ergeben können.

Eine noch ausgedehntere Untersuchung von weiteren stickstoffhaltigen Körpern ist bereits im Gange und wird ohne Zweifel noch weitere Gesichtspunkte zu noch gründlicherer Charakterisierung derselben bieten.

## II. Quantitative Untersuchungen.

Die Erkenntnis des qualitativen Verhaltens der angegebenen Körperklassen gegenüber salpetriger und schwefliger Säure liefert die Grundlage eine Menge neuer quantitativer Methoden.

1. Die Bestimmungen von ausgesprochenen Basen der IV. und V. Klasse neben anderen stickstoffhaltigen Körpern, die  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht anlagern.

Titrationsversuche, die bisher angestellt wurden, um solche Mischungen zu titrieren mit den meist gerühmten Indikatoren wie Rosolsäure, Methylorange, Congorot, Lakmus etc., liefern keine brauchbaren Zahlen infolge von nicht erkennbaren Farbumschlägen. Auch ich habe mich vergebens bemüht, damit einigermassen gute Resultate zu erzielen, während die nachfolgenden Methoden sehr gute Erfolge ergaben.

Die Menge des Amins, das glatt anlagert, neben einem Körper, der nicht anlagert, lässt sich sehr leicht finden, indem man die Mischung mit überschüssigem Natriumnitrit versetzt und dann  $\frac{1}{10}$  N.-HCl zusetzt, bis die Nitritreaktion auftritt. Ebenso verhält es sich zur Bestimmung von Körpern, die  $\text{SO}_2$  quantitativ anlagern oder nicht anlagern. Die Anzahl der Bestimmungsmethoden wird hiermit durch Variationen erstaunlich gross; ich habe bisher nur die akutesten und wichtigsten ausgewählt.

Eine andere Reihe findet sich in Arbeit.

2. Die Bestimmung von ausgesprochenen Säuren der I. und III. Klasse und von organischen Säuren neben den stickstoffhaltigen Körpern der anderen Klassen, die salpetrige Säure nicht anlagern.

Auch hier hat man vergebens versucht, durch Titration, z. B. mit Phenolphthalein, p-nitrophenol-Methoden auszubauen.

Ganz einfach gestaltet sich nun die Sache nach meinen qualitativen Entdeckungen. Ich setze zu Körpern, die aus Natriumnitrit salpetrige Säure in Freiheit setzen, so lange  $\frac{1}{10}$  N.-KOH, bis die Lösung mit  $\text{NaNO}_2$  keine Nitritreaktion mehr gibt. Auch hier resultiert eine Menge von Bestimmungsmethoden, wovon ich jedoch nur die Bestimmung von Dicarbonamidosäuren neben Aminosäuren ausgewählt habe.

### 3. Harnstoffbestimmung.

Die Harnstoffbestimmung ist für die medizinische Chemie von enormer Wichtigkeit. Alle bis jetzt bekannten Methoden sind nach dem Urteil bewährter Analytiker nicht zuverlässig oder zu kompliziert. Eine neue einfache und genaue Methode muss daher willkommen sein.

Ich machte die Beobachtung, dass Amine und Amidosäuren, in sirupförmiger Phosphorsäure gelöst, bei Zusatz

von  $\text{NaNO}_2$  stürmisch Stickstoff entwickeln schon bei Temperaturen unter  $0^\circ$ .

Andere Lösungsmittel zeigen nicht annähernd dieses Verhalten, auch nicht die Einwirkung von Amyl-Äthyl-Benzylnitrit und  $\text{HCl}$  etc.

Ich untersuchte nun, ob die N-Abspaltung bei Harnstoff ganz quantitativ verlief. Nach Einführung bestimmter Abänderungen, die im experimentellen Teil beschrieben, gelang mir dieses auch vollständig.

Die Methode lässt sich sehr leicht auf Harn übertragen, da es sich gezeigt hat, dass, wenn man auch das zehnfache der im Harn neben Harnstoff vorkommenden Bestandteile zu einer bestimmten Menge Harnstoff mischt, die N-Menge nicht wesentlich verändert wird. Es wurden auch eine Anzahl übereinstimmender Analysen mit Harn ausgeführt.

Resultate schwanken zwischen 99 und 100%.

---

# Experimenteller Teil.

---

## Auswahl der Indikatoren.

### Salpetrige Säure.

I. Auf salpetrige Säure (frei und ohne Mineralsäuren) bei Gegenwart von überschüssigem Natriumnitrit.

Von anorganischen Körpern standen zur Verfügung Jodkaliumstärkepapier und Ferrocyankalium; diese erwiesen sich für meine Zwecke als zu wenig scharf. Von organischen wurden untersucht Pyrogallol, Toluylendiamin, Phenylendiamin,  $\alpha$ -Naphthylamin und  $\beta$ -Naphthylamin. Das letzte der angeführten,  $\beta$ -Naphthylamin, ist ein ausserordentlich scharfer Indikator und zwar in heisser gesättigter Lösung. Von der zu untersuchenden Lösung der Base in  $\text{NaNO}_2$  gibt man nach Zusatz einiger Tropfen  $\frac{1}{10}$  N.-HCl eine Probe auf eine Tüpfelplatte und gibt den heissen Indikator zu, sofort erfolgt rote Färbung, sofern die Base nicht anlagert. Alkoholische oder kalt gesättigte Lösungen des Indikators besitzen bei weitem nicht die Stärke in der Reaktionserscheinung.

II. Auf salpetrige Säure (mit Mineralsäuren), z. B. beim Titrieren der mineralsauren Lösung einer Base mit einer Natriumnitritlösung von bekanntem Gehalt.

Folgende Indikatoren kamen in Betracht. In schwefelsaurer Lösung Diphenylamin, Phenol, Antipyrin; letzteres erwies sich als höchst brauchbar. Man gibt ein Körnchen

auf die Tüpfelplatte, hinzu einige Tropfen konz. Schwefelsäure und die auf überschüssiges freies Nitrit zu untersuchende Lösung der Basis.

Von „Kuppelindikatoren“ wurden untersucht:

|               |     |                         |
|---------------|-----|-------------------------|
| Anilin        | und | $\alpha$ -Naphthylamin, |
| „             | „   | $\beta$ -               |
| „             | „   | R.-Salz,                |
| Sulfanilsäure | und | R.-Salz,                |
| „             | „   | $\alpha$ -Naphthylamin, |
| „             | „   | $\beta$ -               |

Letztere beiden Indikatoren erwiesen sich als sehr scharf; der Gehalt der Laboratoriumsluft an salpetriger Säure und der dadurch erfolgten Einwirkung auf die Indikatoren liess mich von deren Anwendung absehen und in diesen Fällen meist Antipyrin anwenden.


### Schweflige Säure.

Angewandt wurde eine  $1/1$  normale Lösung von schwefligsaurem Natron  $\text{Na}_2\text{SO}_3$ , wobei zuerst mit  $1/10$  N.-Säure bis zur Endbildung von saurem schwefligsaurem Natron titriert wurde. Gleichzeitig tritt dann auch bei weiterer Zugabe eines Tropfens Säure freie schweflige Säure auf. Als Reagens auf diese diente jodsaures Kaliumstärkepapier, angefeuchtet mit verdünnter Schwefelsäure. Die Anlagerung an irgend eine Basis wurde konstatiert, indem man zunächst bis zu dem oben angeführten Punkte titrierte und dann die Base zugab. Verschwand die Reaktion oder konnte man je nach der Menge der zugefügten Basis noch mehr  $\text{SO}_2$  in Freiheit setzen, ohne Reaktion mit dem Indikator zu erhalten, so stand die Anlagerung ausser Zweifel. Das jodsaure Kaliumstärkepapier befand sich in einem Verbrennungsschiffchen, welch' letzteres in einem Kork befestigt war, der auf das die Basis und das schwefligsaure Natron enthaltende Kölbchen passte.

## Beschreibung der bei den Titrationen angewandten Bürette.

Es musste bei all diesen Versuchen darauf Bedacht genommen werden, dass weder  $\text{HNO}_3$  oder  $\text{SO}_2$  entweichen konnte beim Titrieren mit Säuren. Dies wurde erreicht mit der von Herrn Dr. Pfyl erfundenen „Unterwasseraustrittsbürette“.

Beistehende Skizze zeigt den unteren Teil derselben; taucht man dieselbe in die zu titrierende Flüssigkeit, so bleibt bei  $a$  ein mit Luft erfüllter Raum, der bis zu der punktierten Linie geht. Öffnet man nun den Hahn, so passiert jeder bei  $c$  austretende Tropfen zuerst die Luftschicht und fällt dann erst in die zu titrierende Flüssigkeit. Es ist also so ein Eintritt der die Bürette bespülenden Flüssigkeit in dieselbe direkt ausgeschlossen.



## Qualitative Methoden.

### Verhalten stickstoffhaltiger Körper gegenüber salpetriger und schwefliger Säure.

Zur Prüfung gelangten die wichtigsten Vertreter aller Körpergruppen mit teilweise bekannter (Alkaloide) oder ganz bekannter Konstitution der in Natur und Technik vorliegenden farblosen Körper.

I. Aliphatische Amine; zur Prüfung gelangten:

a) primäre:

Methylamin, Äthylamin, Propylamin, Benzylamin,  
Allylamin;

b) sekundäre:

Dimethylamin, Diamylamin, Dibenzylamin;

c) tertiäre:

Trimethylamin, Triäthylamin, Tribenzylamin;

d) Diamine:

Äthylendiamin, Propylendiamin, Tetramethylendiamin,  
Pentamethylendiamin.

Die Körper der bis jetzt angeführten Gruppen lagern  
sämtlich  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  quantitativ an (siehe quanti-  
tativer Teil).


## II. Ammoniumbasen:

Cholin, Neurin, Tetraäthylammoniumhydroxyd, Tetra-  
methylammoniumhydroxyd.

Die angeführten Körper lagern  $\text{SO}_2$  und  $\text{HNO}_2$  an.

## III. Guanidine:

Guanidin, Methylguanidin, Triphenylguanidin lagern  
 $\text{SO}_2$  und  $\text{HNO}_2$  an.



lagert weder  $\text{HNO}_2$  noch  $\text{SO}_2$  an.

## IV. Aminoalkohole:

Amino- $\beta$ -propylalkohol lagert  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  an.

## V. Aminoaldehyde:

Glycosamin lagert  $\text{HNO}_2$  nicht an, wohl  $\text{SO}_2$ .

## VI. Aminosäuren:

Glycocoll, Alanin, Leucin, Tyrosin, Asparaginsäure,  
Glutaminsäure.

Die angeführten Körper lagern  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$   
nicht an. (Asparaginsäure und Glutaminsäure machen  
selbst  $\text{SO}_2$  und  $\text{HNO}_2$  frei; vgl. quantitativen Teil.)




# VII. Säureamide.

## a) Einfache Amide:

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Formamid      | Exalgin = Methylantifebrin, |
| Acetamid      | Antifebrin,                 |
| Propionamid   | Phenylacetamid,             |
| Butyramid     | Phenacetin,                 |
| Malonamid,    |                             |
| Succinamid,   |                             |
| Salicylamid,  |                             |
| Acetoluid,    |                             |
| Acetnaphtalid |                             |

lagern  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht an.

## b) Harnstoffderivate:



Harnstoff, Carbaminsaures Äthyl,





Dimethylharnstoff,

Biuret,

lagern  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht an.

# VIII. Acylierte Amidosäuren:





Hippursäure,

Benzoylalanin

machten selbst  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  frei, lagern nicht an.


IX. Säureimide:

Phthalimid, Succinimid, Glutarimid, lagern  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht an.

X. Amidosäureamide und -imide:

Glutamin, Asparagin lagern  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht an.

Phenakol salzs.  $\text{C}_6\text{H}_4\text{OC}_2\text{H}_5(\text{NHCOCH}_2\text{NH}_2)\text{HCl}$



XI. Nitrile:

Acetonitril, Propionitril, Butyronitril, Valeronitril, Capronitril, Benzonitril, Naphtonitril  $\alpha$  und  $\beta$  lagern  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht an.

XII. Rhodanide:

Methylsulfocyanat, Äthylsulfocyanat, Amylsulfocyanat, Isobutylsulfocyanat lagern  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht an.

XIII. Senföle:

Äthylsenfö, Allylsenfö, Phenylsenfö, Tolylsenfö lagern  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht an.

XIV. Nitrosamine:

Nitrosodimethylanilin, Nitrosomonomethylanilin, Nitrosodipropylin, Nitrosodiisobutylin lagern  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht an.


XV. Isonitrosoverbindungen:

Nitrosokampfer, Acetoxim, Acetaldoxim, Benzaldoxim, Methyläthylketoxim lagern  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht an.

## XVI. Monazole:

1. Pyrrol färbt sich mit freier  $\text{HNO}_2$  braun. Anlagerung nicht konstatierbar;  $\text{SO}_2$  wird angelagert.
2. Pyrrolidin: Pyrrolidincarbonsäure lagert weder  $\text{HNO}_2$  noch  $\text{SO}_2$  an.

Nikotin lagert  $\text{NHO}_2$  in  $\text{SO}_2$  an.







3. Indol: Skatol, Indol, lagern beide  $\text{SO}_2$  und  $\text{HNO}_2$  nicht an.


## XVII. Diazole:

1. Pyrrazolone: Antipyrin lagert  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht an.  
3-Phenylpyrazolon lagert  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht an, gibt mit freier  $\text{NHO}_2$  Grünfärbung.

Pyramidon - Dimethylamidoantipyrin lagert  $\text{HNO}_2$  nicht an, lagert  $\text{SO}_2$  an, gibt mit freier  $\text{HNO}_2$  Violettfärbung.





2. m-Diazole:






# XVIII. Diazine.

## a) m-Diazine:



violette Färbung; macht  $\text{SO}_2$  selbst frei, lagert  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht an.




macht  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht frei, lagert  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht an.

## b) p-Diazine:

Piperazin lagert  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  an.

## XIX. Purinkörper:

Harnsäure = 2 · 6 · 8 Trioxypurin.



macht selbst  $\text{HNO}_2$  frei,  $\text{SO}_2$   
nicht, lagert  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$   
nicht an.

|       |             | Methyl.     | Oxy.   | Amino. |
|-------|-------------|-------------|--------|--------|
| 1—6   | Coffein     | = 1 · 3 · 7 | 2 · 6. | —      |
| 2     | Guanin      | = —         | 6.     | 2      |
| 5—7   | Teobromin   | = 3 · 7     | 2 · 6  | —      |
| 3—4—9 | Xanthin     | = —         | 2 · 6. | —      |
|       | Hypoxanthin | = —         | 6.     | —      |
|       | Theacin     | = 1 · 3.    | 2 · 6. | —      |


Diese Körper machen weder  $\text{HNO}_2$  noch  $\text{SO}_2$  frei,  
noch lagern dieselben an.

## XX. Pyridingruppe.

### 1. Pyridin:


Pyridin, Pikolin, Collidin lagern  $\text{HNO}_2$  nicht an,  
doch treten die Reaktionen auf  $\text{HNO}_2$  erst später  
auf bei Anwendung von wenigen Tropfen  $\frac{1}{10}$  n.  $\text{HCl}$   
und zwar zuerst beim Pyridin, dann bei Pikolin  
und zuletzt Collidin.  $\text{SO}_2$  wird angelagert.

Papaverin lagert  $\text{HNO}_2$  nicht an. Reaktionen auf  
 $\text{HNO}_2$  später scharf.  
 $\text{SO}_2$  wird angelagert.



2. Tetrahydropyridine:

Arecolin



lagert  $\text{HNO}_2$  nicht an,  
wohl  $\text{SO}_2$ .

3. Hexahydropyridine:


Piperidin lagert  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  an.

Eucaïn B



CH

lagert  $\text{HNO}_2$  u.  $\text{SO}_2$  an.




Euphtalmin




CH

lagert  $\text{HNO}_2$  und  
 $\text{SO}_2$  an.





Coniïn



lagert  $\text{HNO}_2$  und  
 $\text{SO}_2$  an.

Piperin



lagert  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht an.

## XXI. Chinolingruppe:

### 1. Chinolin:

Chinolin, Isochinolin.

Lepidin.

Chinaldin.

Diese vier Körper lagern  $\text{HNO}_2$  nicht an, doch treten die Reaktionen auf  $\text{HNO}_2$  erst später auf bei Anwendung von wenigen Tropfen  $\frac{1}{10}$  N.-HCl und zwar zuerst bei Chinolin und Isochinolin, dann bei Lepidin und zuletzt bei Chinaldin.

$\text{SO}_2$  wird angelagert.

Analgen  $= \text{C}_6\text{H}_5(\text{OC}_2\text{H}_5) \text{NH}(\text{OOC}_6\text{H}_5)\text{N}$  lagert  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht an.

Oxychinolin lagert  $\text{HNO}_2$  scharf nicht an, lagert  $\text{SO}_2$  an.

Oxylepidin lagert  $\text{HNO}_2$  nicht an. Die Reaktionen auf  $\text{HNO}_2$  sind schärfer als bei Oxychinolin, lagert  $\text{SO}_2$  nicht an.

### 2. Tetrahydrochinoline:

Tetrahydrochinolin lagert  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  an.

Kairolin A.  $=$  Äthyltetrahydrochinolin.

Kairolin M.  $=$  Methyltetrahydrochinolin.

Thallin  $=$  Tetrahydroparachinanisol.

Kairin A.  $=$  Oxychinolinäthyltetrahydrür.

Kairin M.  $=$  Oxychinolinmethyltetrahydrür.


Lagern  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  an.

### 3. Tetrahydroisochinoline:


Tetrahydroisochinolin lagert  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  an.

### 4. Hexahydroisochinoline:


Hydrastin



Narcein




Narkotin




Diese drei Körper lagern  $\text{HNO}_2$  nicht an,  
wohl  $\text{SO}_2$ .

Cotarnin = Strypticin



lagert  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  an.




Atropin = r. Tropasäureester des Tropins,  
lagert  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  an.

Cocain = Methyl-benzoyl-Ecgonin,  
lagert  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht an.

Ecgonin = Tropanol-o.-carbonsäure  
lagert  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  nicht an.

Tropacocain = Benzoyltropanol,  
lagert  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  an.

XXIII. Morphinringgruppe:



Morphin.

Codein = Methylmorphin.

Dionin = Äthylmorphin.

Heroin = Diäthylmorphin.

Peronin = Morphinbenzyläther.

Lagern  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  an.

Thebain lagert  $\text{HNO}_2$  nicht an, wohl  $\text{SO}_2$ .

XXIV. Chiningruppe:

|             |   |                                                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------|
| Chinin      | } | lagern $\text{HNO}_2$ und $\text{SO}_2$ nicht an. |
| Cinchonin   |   |                                                   |
| Conchinin   | } | lagern $\text{HNO}_2$ und $\text{SO}_2$ an.       |
| Cinchonidin |   |                                                   |

XXV. Hexamethylentetramin : Urotropin, lagert  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  an.

XXVI. Aromatische Amine.

Die Untersuchung der Einwirkung von Nitrit in salzsaurer Lösung ergab keine neuen Gesichtspunkte weder bei Aminen noch Hydrazinen.

A. Primäre aromatische

1. ohne saure Substituenten:

Anilin  
Toluidin o.  
Toluidin m.  
Toluidin p.  
Xylidin o.  
Xylidin m.  
Xylidin p.  
 $\alpha$ -Naphthylamin.  
 $\beta$ -Naphthylamin.  
Amidophenol.  
Anisidin o.  
Anisidin p.  
Phenetidin p.

Diese Körper geben sämtlich, wenn sie bei  $0^\circ$  mit salpetriger Säure  $\frac{1}{10}$  N. behandelt werden, Reaktion auf freie  $\text{HNO}_2$ . Gleichzeitig geht die Bildung von Azokörpern vor sich, die bei allen Körpern, mit Ausnahme von  $\alpha$  und  $\beta$ -Naphthylamin, gelb bis gelbrot gefärbt sind. Bei den beiden Ausnahmen geht die Farbe in dunkelrot über. Gefasst und durch den Schmelzpunkt als solche identifiziert wurden dieselben von Anilin, o- und p-Toluidin.

$\text{SO}_2$  wird angelagert.

2. Mit sauren Substituenten:

Amidobenzoesaure o.

Amidobenzoesaure m.

Amidobenzoesaure p.


Dieselben machen  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  frei und geben gelbe Färbungen mit  $\text{HNO}_2$ .

p-Amidobenzoensäuremethylester



Diese beiden Körper machen keine  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  frei, geben aber Azokörper.

Orthoform



B. Sekundäre aromatische Amine:

Monoäthylanilin.

Monomethylanilin.

Diphenylamin.

Bei diesen fand keine sichtbare Veränderung statt und konnte nach Zugabe von zehn Tropfen  $\frac{1}{10}$  N.-HCl freie  $\text{HNO}_2$  konstatiert werden.

$\text{SO}_2$  wird angelagert.

C. Tertiäre aromatische Amine:

Dimethylanilin.

Diäthylanilin.

Dimethyltoluidin para.

Dimethyltoluidin ortho.

Die beiden ersten geben (Dimethylanilin

schneller) grüne Färbungen und Ausscheidungen von Nitrosoverbindungen.

Dimethyltoluidin para gibt gelbrote Färbung, ortho schwach gelbgrün.

SO<sub>2</sub> wird angelagert bei allen.

#### D. Diamine:

Toluylendiamin 1·2·4· meta.

„ 1·3·4· ortho.

„ 1·2·5· para.

Phenylendiamin meta.

„ ortho.

„ para.

Diese Körper geben alle starke Färbungen, bestehen bleibt dieselbe. Bei den meta, bei den ortho-Verbindungen fallen die entsprechenden Azimide heraus und die Lösung wird farblos; bei den para-Verbindungen zuerst prachtvoll grüne Färbungen, die schnell schmutzigbraun werden.

### XXVII. Hydrazine.

#### a) Aromatische:

Phenylhydrazin.

Benzylphenylhydrazin.

Methylphenylhydrazin.

Naphthylhydrazin α.

Naphthylhydrazin β.

Diphenylhydrazin.

Reaktion auf HNO<sub>2</sub> verschwindet sofort, gleichzeitig Auftreten milchiger Trübung bei Hydrazin mit Benzolkern und von starken Färbungen bei solchen mit Naphtalinkern.

SO<sub>2</sub> wird nicht angelagert.

b) Aliphatische:

Hydrazin.

Semicarbazid.

Amidoguanidin lagern  $\text{HNO}_2$  und  $\text{SO}_2$  an.

XXVIII. Betaine:

Betain lagert weder  $\text{HNO}_2$  noch  $\text{SO}_2$  an.

## Quantitative Methoden.

### I. Quantitative Bestimmung von Aminen neben Säureamiden, Amidosäuren, Purinbasen, Kreatin, Kreatinin, Azolen, Diazinen.

Eine direkte Titration mit Säure wäre der einfachste Weg der Bestimmung gewesen, was jedoch an der Unbrauchbarkeit der Indikatoren in diesem Falle scheiterte. Verwandt und nach vielen Titrationsen als unbenützlich erkannt wurden Methylorange, Rosolsäure, Lakmus, Congorot, p-Nitrophenol; entweder trat bei Anwesenheit von Säureamiden etc. überhaupt kein Umschlag ein oder früher resp. später oder derselbe war undeutlich.

Methylamin und andere Basen konnten nun neben den in der Überschrift angeführten Körpern auf folgende Weise titriert werden. Der zu titrierenden Flüssigkeit wird ein Überschuss von Natriumnitrit zugegeben und mit  $\frac{1}{10}$  N.-HCl bis zum Auftreten von freier salpetriger Säure titriert. Dieser Punkt wurde durch Tüpfeln mit  $\beta$ -Naphthylamin (v. Auswahl der Indikatoren) erkannt.

Der Gehalt der reinen Methylaminlösung wurde durch direkte Titration mit  $\frac{1}{10}$  N.-HCl und nach der oben angeführten Methode festgestellt.

10 ccm Methylaminlösung gebrauchten in beiden Fällen 15,6 ccm  $\frac{1}{10}$  HCl. Zugabe von Vertretern der in der Über-

schrift angeführten Gruppen veränderten das Resultat in keiner Weise bei vielen ausgeführten Titrationen.

| Analysen           | Menge<br>der<br>Zugabe | ccm $\frac{1}{10}$ H Cl<br>gefunden<br>für Methylamin |                      |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Glycocoll . . . .  | 0,2                    | 15,6                                                  | } berechnet 15,6 ccm |
| Leucin . . . . .   | 0,2                    | 15,55                                                 |                      |
| Alamin . . . . .   | 0,2                    | 15,6                                                  |                      |
| Tyrosin . . . . .  | 0,1                    | 15,6                                                  |                      |
| Harnstoff . . . .  | 0,2                    | 15,6                                                  |                      |
| Kreatin . . . . .  | 0,1                    | 15,6                                                  |                      |
| Sarkosin . . . . . | 0,2                    | 15,55                                                 |                      |
| Xanthin . . . . .  | 0,1                    | 15,6                                                  |                      |
| Allantoin . . . .  | 0,1                    | 15,6                                                  |                      |
| Acetamid . . . .   | 0,2                    | 15,55                                                 |                      |
| Asparagin . . . .  | 0,2                    | 15,55                                                 |                      |

Auch eine Mischung dieser Körper brachte keine Veränderung im Resultat hervor.

Analyse: Angewandtes Methylamin in ccm  $\frac{1}{10}$  H Cl  
 12,4 ccm  
 gefunden 12,45 ccm.

## II. Quantitative Bestimmung von Aminen neben Pyridin und Homologen.

### 1. Pyridin.

a) Bei überschüssigem Amin. Hier sind die Titrationen unbedingt scharf ausführbar; man versetzt mit überschüssigem Natriumnitrit und titriert mit  $\frac{1}{10}$  N.-H Cl; sobald Reaktion auf freie  $\text{HNO}_2$  mit  $\beta$ -Naphthylamin eintritt, ist das Amin gesättigt.

| Analysen     | angewandtes<br>Methylamin in<br>ccm H Cl $\frac{1}{10}$ | gefunden in<br>ccm H Cl $\frac{1}{10}$ |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| I. Analyse   | 11,5                                                    | 11,5                                   |
| II. Analyse  | 25,0                                                    | 25,1                                   |
| III. Analyse | 28,3                                                    | 28,35                                  |
| IV. Analyse  | 35,2                                                    | 35,25                                  |

b) Pyridin im Überschuss; bis zu einem gewissen Verhältnis von Pyridin zu der Base sind auch diese Titrationen auszuführen ohne weitere Vorkehrungen. Steigt die Menge des Pyridins, so lassen sich auch diese Titrationen durch entsprechende Verdünnung mit Wasser ausführen.

|              | angewandtes<br>Methylamin in<br>ccm H Cl $\frac{1}{10}$ | gefunden in<br>ccm H Cl $\frac{1}{10}$ | Methylamin | Pyridin |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------|
| I. Analyse   | 15                                                      | 15,05                                  | 0,0465     | 0,2     |
| II. Analyse  | 15                                                      | 15,1                                   | 0,0465     | 0,3     |
| III. Analyse | 25,1                                                    | 25,2                                   | 0,0777     | 0,5     |
| IV. Analyse  | 25,1                                                    | 25,2                                   | 0,0777     | 1,0     |

Bei den höheren Homologen Picolin und Collidin waren die Endpunkte unscharf.

### III. Quantitative Bestimmung von Aminen neben Chinolin und Homologen.

Bei Pyridin sahen wir, dass mit zunehmendem Prozentgehalt desselben die Bestimmungen schwieriger auszuführen waren und man zu einer entsprechenden Verdünnung der zu titrierenden Flüssigkeit greifen musste. Dies fällt beim Chinolin weg und lässt sich dasselbe in allen Konzentrationen neben Aminen bestimmen. Ebenso Lepidin, beim Chinaldin hilft wieder Verdünnung.

Analysen:

| 1. Chinolin:  | angewandtes<br>Methylamin in<br>ccm $\frac{1}{10}$ H Cl | gefundenes<br>Methylamin in<br>ccm $\frac{1}{10}$ H Cl | Menge<br>des<br>Chinolin  |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| I. Analyse    | 13,6                                                    | 13,6                                                   | 0,2 g                     |
| II. „         | 16,5                                                    | 16,55                                                  | 0,5 g                     |
| III. „        | 20,4                                                    | 20,4                                                   | 1,0 g                     |
| IV. „         | 20,9                                                    | 20,95                                                  | 2,0 g                     |
| V. „          | 26,3                                                    | 26,35                                                  | 3,0 g                     |
| 2. Lepidin:   |                                                         |                                                        | Menge<br>des<br>Lepidin   |
| I. Analyse    | 13,6                                                    | 13,65                                                  | 0,05 g                    |
| II. „         | 16,5                                                    | 16,5                                                   | 0,075 g                   |
| III. „        | 20,4                                                    | 20,4                                                   | 0,1 g                     |
| IV. „         | 20,9                                                    | 20,9                                                   | 0,15 g                    |
| V. „          | 26,3                                                    | 26,35                                                  | 0,2 g                     |
| 3. Chinaldin: |                                                         |                                                        | Menge<br>des<br>Chinaldin |
| I. Analyse    | 13,6                                                    | 13,65                                                  | 0,2 g                     |
| II. „         | 16,5                                                    | 16,6                                                   | 0,5 g                     |
| III. „        | 20,4                                                    | 20,45                                                  | 1,0 g                     |
| IV. „         | 20,9                                                    | 20,95                                                  | 2,0 g                     |
| V. „          | 26,3                                                    | 26,4                                                   | 3,0 g                     |

**IV. Quantitative Bestimmung von Dicarbonaminosäuren neben Aminosäuren (Mono).**

1. Asparaginsäure neben Glycocoll, Alanin, Leucin, Tyrosin.

a) Analyse: angewandt Asparaginsäure 0,405 g.

Glycocoll 0,2

Alanin 0,2

Leucin 0,2

Tyrosin 0,2

verbraucht 30,3 ccm  $\frac{1}{10}$  N.-K OH  
 = 0,403 g Asparaginsäure.

Indikator  $\frac{1}{10}$  Na NO<sub>2</sub> in  $\beta$ -Naphthylamin.

b) Analyse: angewandt Asparaginsäure 0,260 g.  
 Glycocoll 0,4  
 Alanin 0,4  
 Leucin 0,4  
 Tyrosin 0,2

verbraucht 19,7 ccm  $\frac{1}{10}$  N.-K OH  
 = 0,262 g Asparaginsäure.

2. Glutaminsäure neben Glycocoll, Alanin, Leucin, Tyrosin.


Analyse: angewandt Glutaminsäure 0,500 g.

Glycocoll 0,4  
 Alanin 0,4  
 Leucin 0,4  
 Tyrosin 0,2

verbraucht 33,5 ccm  $\frac{1}{10}$  N.-K OH  
 = 0,492 g Glutaminsäure.

## V. Quantitative Harnstoffbestimmung.

Löst man Harnstoff in sirupförmiger Phosphorsäure und lässt man darauf  $\frac{1}{1}$  N.- oder  $\frac{1}{2}$  N.-Natriumnitrit in wässriger Lösung einwirken, so zerfällt der Harnstoff in Stickstoff und Kohlensäure. Auf dem Messen des gebildeten Stickstoffs beruht diese einfache Methode, die für die Bestimmung von Harnstoff im Harn Anwendung finden wird.



### Analysen.

Zunächst wurde mit einer 2 %igen Harnstofflösung, was dem normalen Gehalt des Harns an Harnstoff entspricht, ge-

arbeitet. Verwandt wurden immer 2 ccm = 0,04 Harnstoff. In einem breiten Gefäss, was ungefähr 100 ccm Inhalt hat, befinden sich 80 ccm sirupöse Phosphorsäure, 2 ccm der Harnstofflösung und 0,2—0,3 g fein verteilter Talg, um die bei der Entwicklung entstehenden Schaumblasen zusammengehen zu lassen. Durch den luftdicht schliessenden Kork gehen drei Teile

1. das Capillarrohr zum Eudiometer (100 ccm), das mit stark alkalischer Permanganatlösung gefüllt ist,
2. die im Anfang des experimentellen Teiles beschriebene Unterwasseraustrittsbürette mit  $\frac{1}{1}$  N.-NaNO<sub>2</sub>,
3. der unten beschriebene Mischapparat.

Nach beendeter Einwirkung lässt man den Apparat aus der Bürette voll laufen und zieht die Kubikzentimeter von der Menge Stickstoff ab.

- I. Analyse. Angewandt 0,04 g Harnstoff = 2 ccm d. Lösung.  
Gefunden 33,8 ccm N bei 19° und 730°  
= 0,0399 Harnstoff.
  - II. Analyse. Angewandt 0,04 g Harnstoff = 2 ccm d. Lösung.  
Gefunden 34 ccm N bei 19° und 722°  
= 0,0400 Harnstoff.
  - III. Analyse. Angewandt 0,04 g Harnstoff = 2 ccm d. Lösung.  
Gefunden 33,7 ccm N bei 19° und 730°  
= 0,0398 Harnstoff.
  - IV. Analyse. Angewandt 0,04 g Harnstoff = 2 ccm d. Lösung.  
Gefunden 34,5 ccm N bei 19° und 730°  
= 0,0407 Harnstoff.
  - V. Analyse. Angewandt 0,04 g Harnstoff = 2 ccm d. Lösung.  
Gefunden 33,8 ccm N bei 17° und 722°  
= 0,0398 Harnstoff.
-

# Luftdicht abschliessender Mischapparat (Dr. Pfyl.)

Der Glasstab  $a$  mit den beiden Mischvorsprüngen aus Gummi  $b$  bewegt sich, durch einen Gummi  $c$  verbunden mit dem Rohr  $d$ , in der grossen Büchse  $f$  auf und ab. Das Quecksilber, bezeichnet mit  $Hg$ , verhindert ein Entweichen der Gase; der innere Teil der Büchse, bezeichnet mit  $f_1$ , verhindert bei genügender Höhe ein Übersteigen des Quecksilbers bei raschem Arbeiten in den inneren Raum.

Bei  $f_3$  sitzt der Apparat luftdicht auf dem Entwicklungsgefäss auf.



### Harnanalysen

bei beiden Versuchen der gleiche Harn.

I. Analyse. Angewandt 2 ccm des Harns

Gefunden 32 ccm N bei 17° und 724°

= 0,0378 Harnstoff

= 1,89% Harnstoff im Harn.

II. Analyse. Angewandt 2 ccm des Harns

Gefunden 32,2 ccm N bei 17° und 724°

= 0,0380 Harnstoff

= 1,9% Harnstoff im Harn.

Analyse zwecks Erkennung, ob die übrigen im Harn vorkommenden N-haltigen Körper das Resultat beeinflussen.

Angewandt 0,04 g Harnstoff

0,01 g Harnsäure

0,01 g Kreatmin

0,01 g Hippursäure

0,01 g Oxalursäure

Gefunden 34,4 ccm N bei 17° und 722°

= 0,0406 Harnstoff.

## Lebenslauf.

---

Unterzeichneter wurde geboren am 2. Januar 1878 zu Köln a. Rhein als Sohn des Obergometers Jos. Lequis. Er besuchte ebendasselbst das Gymnasium (Real-Abteilung) bis Unterprima (excl.) und wandte sich dann dem Apothekerberufe zu. Oktober 1901 bestand er in München sein Staatsexamen als Apotheker und studierte dann weiter Chemie, um jetzt in seinem zehnten Semester die Doktorwürde zu erwerben.

**Kurt Lequis.**





